# medimex Bowie+Dick Einmal-Testpaket DIN EN ISO 11140-4, 134°C/3,5 min

## **Gebrauchsanweisung**

#### REF.MX

#### 8M50470001

## Verwendungszweck:

Das medimex Bowie+Dick Einmal-Testpaket ist zur Durchführung des täglichen Luftentfernungsund Dampfdurchdringungstestes bei 134°C und einer Haltezeit von 3,5 Minuten in Vorvakuum-Dampfsterilisatoren bestimmt. Das medimex Bowie+Dick Einmal-Testpaket bietet eine direkte visuelle Anzeige von unzureichender Entlüftung oder Luftundichtigkeit, Störungen der Vakuumpumpe, dem Auftreten von nichtkondensierbaren Gasen, hoher Temperatur, unzureichender Dampfdurchdringung und Problemen mit Nassdampf.

Der medimex Bowie+Dick Test ist zum Einmalgebrauch bestimmt.

Der Indikator entspricht Typ 2 nach DIN EN ISO 11140-1.

#### **Anwendung:**

- 1. Das Bowie+Dick Einmal-Testpaket in die leere Sterilisierkammer legen. Das Testpaket soll nach EN 285 in die Mitte des vorgeheizten Autoklaven eingelegt werden (10 20 cm über dem Kammerboden).
- 2. Den Bowie+Dick-Zyklus starten (Programm: 3,5 Minuten Haltezeit bei 134°C).
- 3. Das Testpaket nach Beendigung des Bowie+Dick-Zyklus aus der Sterilisationskammer entnehmen, öffnen und Indikatorkarte auf Farbumschlag prüfen. Testergebnisse auf der Indikatorkarte vermerken und ggf. zur Dokumentation aufbewahren.

#### **Beurteilung:**

### Testbedingungen erfüllt:

Vollständige Verfärbung der Indikatorfarbe von blau bzw. hellblau nach schwarz.

- Keine unzulässige Restluft vorhanden
- Dampfdurchdringung erfolgte gleichmäßig
- Sterilisator ist funktionstauglich

## Testbedingungen nicht erfüllt:

Kein vollständiger Farbumschlag der Indikatorfarbe von blau bzw. hellblau nach schwarz. Die mögliche Ursache kann mit dem beiligenden Auswertungsschema ermittelt werden.

- Durch Restluft im Zentrum des Testpaketes erfolgte keine komplette Verfärbung nach schwarz
- Leuchtend blaue bzw. braune Aufhellung im Zentrum des Testbogens
- Kein kompletter Farbumschlag durch nicht ausreichende Zeit- bzw. Temperaturwirkung oder unzureichende Dampfeinwirkung
- Überprüfen Sie in diesem Fall Ihren Sterilisator

Ggf. Überprüfung der Testbedingungen und Wiederholung des Bowie+Dick-Testes.

www.medimex.de